Приложение к тендерной документации по закупу дезинфицирующих средств

Перечень закупаемых товаров

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Место поставки	Срок поставки
Дезинфицирующие средтсва								
1	Порошкообразное средство для очистки и дезинфекции, а также - стерилизации ИМН (в том числе – эндоскопов) и ДВУ эндоскопов; очистки и дезинфекции поверхностей, различных объектов	ДВ:Алкилдиметилбензиламмония хлорид не менее - 2,38%, перкорбанат натрия не более - 47%. Тетраацетиленэтилендиамин не менее - 25%, антикоррозийные добавки, В рабочем растворе ДВ - надуксусная кислота и алкилдиметилбензиламмония хлорид. для очистки и дезинфекции, а также - стерилизации ИМН (в том числе – эндоскопов) и ДВУ эндоскопов; очистки и дезинфекции поверхностей, различных объектов, биологических отходов при различных инфекциях (в том числе – при обсеменении спорообразующими бактериями) в ЛПО различного профиля, различных лабораториях, в отделениях детских и неонатологии, а также - на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, учреждениях соцобеспечения и т. д. на основе надуксусной кислоты и ЧАС в качестве действующих веществ. Концентрация активного кислорода - не менее 10%. Надуксусная кислота (НУК), образуется при разведении порошка в воде. pH 1% водного раствора средства не должен превышать 9,0. Срок годности рабочих растворов не менее 24 часа с момента приготовления. Средство должно быть эффективно в отношении грамм- и грамм+ бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, особо опасных инфекций (легионеллеза, чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), микобактерий туберкулеза – (тестировано на Mycobacterium avium и Mycobacterium terrae); вирусов (всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе ротавирусов, норовирусов, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов А, В и С, ВИЧ, герпеса, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), гриппа человека, в том числе штаммов «птичьего» H5N1 и «свиного» H1N1 и др.), грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов; спор бактерий (в том числе Bacillus subtilis, Clostridium difficile). Ведро вместимостью не менее 5 кг.	ведро	2	50 000,00	100 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
2	Салфетки сухие (р.135х360 мм)	Салфетки должны представлять собой полотно из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м², свернутого в рулон перфорированной лентой, в количестве 160 штук, размер салфетки не менее 135 мм*360 мм (ширина*длина). Вес салфеток в рулоне не менее 300 г. Для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей и различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью (кроме изготовленных из материалов, подверженных воздействию спиртов): - небольшие по площади помещения; - поверхности жесткой мебели; - поверхности медицинских приборов и оборудования; - оптические приборы и оборудование, разрешенные производителем к обработке спиртовыми средствами; - датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.); - предметы ухода за больными, игрушки из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл и др.); - наружные поверхности шлангов гибких эндоскопов и колоноскопов; - поверхности кувезов; Форма выпуска: Упаковка- Рулон не менее 160 шт и не более 180 шт.	упаковка	400	3 900,00	1 560 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
3	Жидкое мыло для мытья рук перед обработкой антисептиком, для гигиенической обработки рук медицинского персонала и санитарной обработки кожных покровов. Флакон 1 литр	Средство должно представлять собой готовый к применению препарат-жидкое мыло-в виде однородной жидкой гелеобразной массы голубого цвета с запахом отдушки. В качестве антисептического компонента должно содержать ундецилеламидопропилтримониумметилсульфата (тетранилУ) не менее 0,5% и не более 0,7%. Не должно содержать активного хлора, альдегидов и перекисных соединений. Средство должно относится к ГОСТ 12.1.007-76 - 4 класс (малоопасные вещества) при нанесении на кожу и при введении в желудок. Средство должно обладать бактерицидной (антибактериальной) активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза) и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов и трихофитий. Форма выпуска: флакон вместимостью не менее 1 литра.	флакон	500	2 500,00	1 250 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

4	Жидкое мыло для мытья рук перед обработкой антисептиком, для гигиенической обработки рук медицинского персонала и санитарной обработки кожных покровов. Канистра 5 литров	Средство должно представлять собой готовый к применению препарат-жидкое мыло-в виде однородной жидкой гелеобразной массы голубого цвета с запахом отдушки. В качестве антисептического компонента должно содержать ундециленамидопропилтримониумметилсульфата (тетранилУ) не менее 0,5% и не более 0,7%. Не должно содержать активного хлора, альдегидов и перекисных соединений. Средство должно относится к ГОСТ 12.1.007-76 - 4 класс (малоопасные вещества) при нанесении на кожу и при введении в желудок. Средство должно обладать бактерицидной (антибактериальной) активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза) и фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов и трихофитий. Форма выпуска: канистра вместимостью не менее 5 литров.	канистра	100	11 200,00	1 120 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
5	Кожный антисептик-гель, безспиртовой на основе ЧАС, для гигиенической и хирургической обработки рук. Флакон 1 литр	Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик гель в виде прозрачной или опалесцирующей жидкости, светло-голубого цвета с запахом отдушки. В качестве действующих веществ должен содержать дидецилдиметиламмоний хлорид не более 0,30% и не менее 0,20% , N,N-бис(3-аминопропил) додециламин не менее 0,40% и не более 0,50%, молочную кислоту не менее 0,32%.также другие увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки.Срок годности средства при условии его хранения в невкрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет со дня изготовления. Средство должно вызывать гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандида и трихофитон), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.), Средство должно сохранять свои свойства после замораживания и оттаивания. Средство должно обладать пролонгированным эффектом в течение 1 часа. Должно предназначаться для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок,приеме родов в ЛПУ любого профиля,включая детские отделения и отд.неонаталогии. Форма выпуска: флакон вместимостью не менее 1 литра.	флакон	250	3 000,00	750 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
6	Кожный антисептик на основе пропилового спирта для обработки рук хирургов, мест инъекций, локтевых сгибов доноров, операционного поля, перчаток. Флакон 1 литр	Состав: является готовым к использованию раствором в виде прозрачной жидкости со специфическим запахом спиртов; В качестве действующих веществ должно содержать пропиловый спирт (пропанол-1) не менее 43% и не более 46%, клатрат алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида с мочевиной не менее 0,5% и не более 0,76% и хлоргексидинбиклюконат не менее 0,25% и не более 0,3%, а также функциональные добавки и ухаживающие за кожей компоненты. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа, гепатиты А, В, С, D, ВИЧ-инфекции, полиомиелит, герпес, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп и др.), грибов (возбудителей дерматофитий и кандидозов). Средство должно обладать пролонгированным действием не менее 3 часов. Средство должно быть предназначено: - для обработки рук хирургов: двукратное нанесение не более, чем по 5 мл при времени обработки не более 4 минут; - для обработки операционного поля, локтевых сгибов доноров методом протирания двукратно - при времени обработки не более 2 минут; - для обработки инъекционного поля методом протирания при времени экспозиции не более 20 секунд; - для гигиенической обработки рук: не менее 3 мл при времени обработки не более 30 секунд; - для дезинфекции небольших по площади поверхностей, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования методом протирания при вирусных инфекциях при времени экспозиции не более 1 минуты. Форма выпуска: флакон вместимостью не менее 1 литра.	флакон	250	3 500,00	875 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

7	Кожный антисептик на основе пропилового спирта для обработки рук хирургов, мест инъекций, локтевых сгибов доноров, операционного поля, перчаток. Канистра 5 литров	Состав: является готовым к использованию раствором в виде прозрачной жидкости со специфическим запахом спиртов; В качестве действующих веществ должно содержать пропиловый спирт (пропанол-1) не менее 43% и не более 46%, клатрат алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида с мочевиной не менее 0,5% и не более 0,76% и хлоргексидинбиклюконат не менее 0,25% и не более 0,3%, а также функциональные добавки и ухаживающие за кожей компоненты. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа и парагриппа, гепатиты А, В, С, D, ВИЧ-инфекции, полиомиелит, герпес, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп и др.), грибов (возбудителей дерматофитий и кандидозов). Средство должно обладать пролонгированным действием не менее 3 часов. Средство должно быть предназначено: - для обработки рук хирургов: двукратное нанесение не более, чем по 5 мл при времени обработки не более 4 минут; - для обработки операционного поля, локтевых сгибов доноров методом протирания двукратно - при времени обработки не более 2 минут; - для обработки инъекционного поля методом протирания при времени экспозиции не более 20 секунд; - для гигиенической обработки рук: не менее 3 мл при времени обработки не более 30 секунд; - для дезинфекции небольших по площади поверхностей, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования методом протирания при вирусных инфекциях при времени экспозиции не более 1 минуты. Форма выпуска: канистра вместимостью не менее 5л.	канистра	50	17 000,00	850 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
8	Кожный антисептик безспиртовой на водной основе для гигиенической и хирургической обработки рук, мест инъекций, локтевых сгибов доноров, операционного поля. Канистра 5 литров	Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной бесцветной жидкости, пенящейся при встряхивании, со слабым запахом отдушки или без запаха. В качестве действующих веществ должен содержать полигексаметиленгуанидин гидрохлорид не более и не менее(0,5±0,05%) и дидецилдиметиламмоний хлорид не более и не менее (0,5±0,05%), а также аллантоин и другие увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки. Безспиртовой кожный антисептик. Предназначен для обработки с целью дезинфекции в ЛПУ перчаток из различного материала надетых на руки медицинского персонала. Срок годности средства при условии его хранения в невкрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет со дня изготовления. Средство должно вызывать гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандида и трихофитон), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.), Средство должно сохранять свои свойства после замораживания и оттаивания. Средство должно обладать пролонгированным эффектом в течение 3 часов. Должно предназначаться для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок, для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов, для гигиенической обработки рук медицинского персонала, для ступней ног и т.д. Форма выпуска: канистра вместимостью не менее 5л.	канистра	50	15 500,00	775 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
9	Кожный антисептик-гель, безспиртовой на основе ЧАС, для гигиенической и хирургической обработки рук. Флакон 90 мл	Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик гель в виде прозрачной или опалесцирующей жидкости, светло-голубого цвета с запахом отдушки. В качестве действующих веществ должен содержать дидецилдиметиламмоний хлорид не более 0,30% и не менее 0,20% , N,N-бис(3-аминопропил) додециламин не менее 0,40% и не более 0,50%, молочную кислоту не менее 0,32%.также другие увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки.Срок годности средства при условии его хранения в невкрытой упаковке производителя должен составлять не менее 5 лет со дня изготовления. Средство должно вызывать гибель грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандида и трихофитон), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.), Средство должно сохранять свои свойства после замораживания и оттаивания. Средство должно обладать пролонгированным эффектом в течение 1 часа. Должно предназначаться для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок,приеме родов в ЛПУ любого профиля,включая детские отделения и отд.неонаталогии. Форма выпуска: флакон с дозатором вместимостью не более 90 мл.	флакон дозатор	150	1 300,00	195 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

10	Средство на основе ПГМГ для проведения генеральных уборок в ЛПУ в таблетированной форме.(не должен содержать хлора, четвертично-аммониевых соединений (ЧАС). Банка 300 грамм	Средство должно представлять собой таблетки массой не менее 0,9 грамма и не более 1,1 грамма. В качестве действующих веществ должно содержать не менее 24,5% и не более 27,5% полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и не менее 4,5% и не более 5,5% тетраметилендиэтилентетрамина, а также другие синергетические и функциональные компоненты. Не должно содержать активного хлора, четвертично-аммониевых соединений (ЧАС). Срок годности рабочего раствора не менее 28 суток. Средство активно в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов (Аспергиллюс), возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции. Количество рабочего раствора, приготавливаемого из 1 банки (не менее 300 гр) средства, в том числе: - для дезинфекции поверхности в помещениях при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях со временем экспозиции не более 60 минут - количество приготовленного раствора должно быть не менее 3000 литров; - для дезинфекции поверхности в помещениях при вирусных инфекциях со временем экспозиции не более 45 минут - количество приготовленного раствора должно быть не менее 1500 литров; - для дезинфекции жидких отходов (кровь, выделения больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы) при времени экспозиции не более 60 минут - количество приготовленного раствора должно быть не менее 750 литров; - для дезинфекции медицинских отходов при времени экспозиции не более 60 минут - количество приготовленного раствора должно быть не менее 1500 литров; - при проведении генеральных уборок (хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории, операционные, перевязочные), при времени экспозиции не более 90 минут - количество приготовленного раствора должно быть не менее 3000 литров; - для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) ручным способом при времени экспозиции не более 60 минут - количество приготовленного раствора должно быть не менее 1500 литров. Форма выпуска: банка вместимостью не менее 300 грамм.	банка	100	11 200,00	1 120 000,00	г Актобе, ул Алтынсарина 3А, ГКП "ОПЦ"	2018 год, по Заявке Заказчика. Поставка после Заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
	ИТОГО					**8 595 000,00**		